

3 Modulaire richtlijnen 3.4: Zandvliegen en muggen



Zandvliegen (Psychodidae) en muggen (Culicidae) zijn bloedzuigende insecten die een belangrijke rol spelen als vector van door vectoren overgedragen aandoeningen.

Zandvliegen. In Europa zijn alleen de zandvliegen van het geslacht *Phlebotomus* van veterinaire belang en deze spelen een belangrijke rol als vector van protozoaire parasieten van het geslacht *Leishmania*. *Leishmaniose* is een ernstige aandoening bij de hond, die het belangrijkste reservoir vormt van deze parasiet in Europa. *Leishmaniose* vormt een gevaar voor de volksgezondheid, vooral voor kinderen en volwassenen met verminderde immunitet.

Muggen spelen een belangrijke rol als vector voor de pathogenen *Dirofilaria immitis* (hartworm) en *Dirofilaria repens*. Hartworm is de meest pathogene soort, maar *D. repens* is de meest belangrijke soort die verantwoordelijk is voor zoöotische infecties in Europa.

Verspreiding


Zandvliegen zijn goed aangepast aan (sub)tropische klimaten en komen wildverspreid voor in mediterrane gebieden. De verspreiding van deze insecten breidt zich uit tot het noorden van Frankrijk en Ierland in Zuid-Duitsland en Zuid-Zwitserland.

Wereldwijd zijn er meer dan 3500 **muggen** soorten bekend. De belangrijkste vectoren in Europa zijn van het geslacht *Culex*, *Aedes* en *Anopheles*. Recentelijk heeft de Azatische tijgermug *Aedes albopictus*, die zich verspreidt over Europa, latenter een competentie vector te zijn van verschillende pathogenen, waaronder *D. immitis*.

Levenscyclus

Zandvliegen ontwikkelen zich in leefgebieden met veel grond en organisch materiaal in plaats van een waterrijk milieu. De vrouwelijke zandvliegen gaan tijdens zonsopgang en na zonsondergang op zoek naar gastheren voor bloedmaaltijden om eitjes te produceren. Deze ontwikkelen zich tot larven, die op hun beurt vier ontwikkelingstadia doormaken voordat ze verpoppen en de volwassen zandvliegen tevoorschijn komen.

Muggen ontwikkelen zich in waterrijke gebieden via vier duidelijk te onderscheiden stadia. De eitjes komen alleen uit in water. De vrouwelijke muggen beginnen bloed te zuigen waarna enkele dagen later de eiproduktie start. De levenscyclus neemt twee weken in beslag, maar is afhankelijk van de omstandigheden en kan variëren van 4 dagen tot zelfs een maand.



Klinische verschijnselen

De bijtplekken bevinden zich voornamelijk op haarloze gebieden, zoals oorschelpen, snuit en de buik, maar kunnen zich ook bevinden op de oogleden, de voetzooltjes en de staart. De beten kunnen pijnlijk zijn en leiden tot rode verhevenheden.

Diagnose

Muggen zijn gemakkelijk te herkennen, maar zandvliegen worden slechts zelden waargenomen, omdat ze erg klein zijn. Rode verhevenheden op het lichaam van het dier zijn soms de eerste symptomen van een beet en deze kunnen zich ontwikkelen tot lokale huidaësies.

Behandeling en bestrijding

Zandvliegen Gebruik regelmatig een insecticide met repellent werking tegen zandvliegen gedurende het gehele seizoen¹ (april tot november).

Het advies is om zandvliegenbieten te voorkomen in endemische gebieden. Dat kan door minimalisering van de blootstelling van honden aan zandvliegen, geen huisdieren mee te nemen naar leishmaniose endemische gebieden of ze anders hier binnen te houden na het invallen van de schenmering gedurende het gehele zandvliegenseizoen.

Het verwijderen van afval en organisch materiaal in de buurt van huizen en op plaatsen waar honden even, kan het risico op zandvliegenbieten verminderen.

Muggen. Gebruik regelmatig insecticide met repellent werking ter preventie van muggenbitten. Vermijd tijdens en gebieden waar muggen actief zijn.

Installeer hoven in ramen en deuren om muggen buiten te houden. Verminder het aantal muggen rondom het huis door het regelmatig legen van poeltjes met stilstaand water².



Zandvlieg¹



Mug

¹ Raadpleeg www.esccap.eu voor de behandelstabellen per land of gebied.

² Raadpleeg voor aanvullende informatie:
ESCCAP Richtlijn 3: Bestrijding van ectoparasieten bij hond en kat en
ESCCAP Richtlijn 5: Bestrijding van door vectoren overgedragen aandoeningen bij hond en kat.
E Foto Dr. Rosa Gálvez, Veterinary Faculty, UCM.